

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μ.Γκιώνης¹ , Κ.Μανιμανάκη⁵, Γ.Καϊμασίδης¹, Μ.Δουλαπτσής²,
Κ.Κασάπας³, Γ.Φιλιππάκης¹, Α.Δασκαλάκη³, Σ.Ντόλκα⁴, Μ.Μουστάρδας¹

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

2 Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

3 Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

5 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Η πλειονότητα των κακώσεων αφορά την βραχιόνιο αρτηρία
- Το 90% των κακώσεων οφείλονται σε διατιτραίνων τραύμα
- Η επανάκτηση της λειτουργικότητας του άκρου συχνά σχετίζεται με την συνοδό βλάβη του νεύρου
- Οι φλεβικές βλάβες σπάνια απαιτούν αποκατάσταση (ακόμη και η βραχιόνια / μασχαλιαία φλέβα μπορούν να απολινωθούν - εκτενές παράπλευρο -)

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Η παρουσία περιφερικών σφύξεων [ΔΕΝ](#) αποκλείει κεντρικότερη βλάβη
- $\Delta P > 20 \text{ mmHg}$ ή $\text{API} < 0,9$ απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση
- 30% των κακώσεων περιλαμβάνουν κάκωση του βραχιονίου πλέγματος
- Νευρολογική εκτίμηση
- Απεικόνιση (color Duplex, D.S.A.)

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Άρρεν, 35 ετών, α/α διπολικής διαταραχής
- Τραύμα από πυροβόλο όπλο σε (Αρ) ημιθωράκιο, (Αρ) μασχαλιαία χώρα και άνω ήμισυ του βραχίονα (διατομή μασχαλιαίας αρτηρίας, φλέβας, βραχιονίου πλέγματος, ανοιχτό κάταγμα βραχιονίου οστού, καταστροφή της πλειονότητας των μυϊκών ομάδων, αιμοθώρακας (Αρ), θλάσεις (Αρ) πνεύμονα)

**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**




ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Χορήγηση υγρών στο ΤΕΠ
- CT θώρακος
- Τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης θώρακος (Αρ)
- Χειρουργείο

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Αγγειακό control περιφερικά / κεντρικά
- Οστεοσύνθεση (Αρ) βραχιονίου με Nanci nails
- Ανεύρεση κολοβωμάτων του βραχιονίου πλέγματος και τοποθέτηση markers

**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**



**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**


ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Λήψη αυτόλογου φλεβικού μοσχεύματος (Δε μείζονος σαφηνούς φλέβας)
- Αρ μασχαλοβραχιόνια παράκαμψη
(ανεστραμμένη ΜΣΦ στην αρτηρία, ορθόδρομη στη φλέβα)
- Ανάκτηση περιφερικών σφύξεων

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ



**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**



**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**



ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Εκτενές debridement του τραύματος και μερική σύγκλειση με 4 αραιές ραφές
- Χρήση εμποτισμένων με υπέρτονα κομπρεσών (όχι Betadine, αιμοστατικά ή άλλα υλικά)

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Χρόνος νοσηλείας στη ΜΕΘ: 3 ημέρες
- Συνολικός χρόνος νοσηλείας: 25 ημέρες
- Αλλαγές τραυμάτων στο χειρουργείο
- 2 επιπλέον χειρουργικά debridements κατά τη νοσηλεία του, δημιουργία μυοδερματικού κρημνού, τελική σύγκλειση
- Αποκατάσταση βραχιονίου πλέγματος σε β' χρόνο με Sural graft

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ


- Εργαστηριακός έλεγχος εξόδου:
U:25, Cr:0.7, K:5.2, Na:139
WBC:9.960, Hb:10, Hct:29.3
- Έλαβε 18 ημέρες Μεροπενέμη / Τειϊκοπλανίνη και έπειτα
βάση καλλιεργειών για 10 ημέρες Κολλιστίνη / Λινεζολίδη
- Δεν εμφάνισε πυρετό κατά την νοσηλεία του
- ΗΜΓ σε β' χρόνο για εκτίμηση αποκατάστασης του
βραχιονίου πλέγματος
- Salospir 80mg X 1 για 1 έτος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ



- Triplex αγγείων Αρ άνω άκρου 3 μήνες μετά την επέμβαση



**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**



ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ



**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**

3 μήνες μετά την επέμβαση

